

الباب الاول

علاقة الكيمياء بالعلوم الاخرى

الطب لو جالك طريقة عمل جهاز معين فجسم الكائن الحى انقباض عضلة القلب ارتفاع الحجاب الحاجز
البيولوجى لو جالك التفاعلات التى تحدث داخل الجسم او له علاقة بالخلايا وتركيبها مثل احتراق الغذاء البناء الضوئى ترسيب الشاى للحديد المودود فى الغذاء
الفيزياء فى السؤال علاقة او ظاهرة طبيعية او اتجاه حركة حركة الدم عكس اتجاه الجاذبية الضغط

اسئلة الاختيار من متعدد

١- العلم الذي يهتم بدراسه عمليه تحول الماء السائل الى بخار ماء والعكس ، للحفاظ على اتزان الطبيعة هو علم

(أ) الكيمياء البيئيه (ب) الكيمياء العضويه (ج) الكيمياء التحليليه (د) الكيمياء الفيزيائيه

٢- علاقة بين مفهومين او اكثر يمكن التعبير عنهم رياضيا.....

[أ] حقيقة علمي (ب) مفهوم علم (ج) نظريه (د) جميع ما سب

٣- ايا مما يلى لايدخل ضمن الاستقصاء العلمى.....

[أ] التحليل (ب) الاختبار (ج) الانحياز (د) جميع ما سبق

٤- تعتمد فكرة المعامل المختلفة على مبادئ.....

[أ] المعاييره (ب) القياس (ج) الكيمياء (د) جميع ما سبق

٥- التطور الصناعى والتكنولوجيا هو نتاج التطبيق الصحيح لمبادئ.....


[أ] التحليل (ب) القياس (ج) الكيمياء (د) جميع ما سبق

٦- ما فرع علم الكيمياء الذى يختص بتحليل مواد التغليف فى البيئة.....

[أ] الكيمياء الحيويه (ب) الكيمياء البيئيه (ج) العضويه (د) جميع ما سبق

٧- الشكل المقابل يمثل الدورة الدموية فى جسم الانسان ويتضح منها


وجود تكامل بين علم



أ- الكيمياء والطب فقط . ب- الكيمياء والصيدلة فقط

ج- الكيمياء والطب والفيزياء د- الكيمياء والصيدلة والفيزياء

٨- القيت كرتين متماثلتين تماما في الماء الموجود في المقدار المدرج شكل (١) .



فارتفاع مستوى سطح الماء فيه كما بالشكل (٢)

ما حجم الكره الواحد.

(أ) 10 ml (ب) 5 ml (ج) 40 ml (د) 20 ml


٩- كل مما ياتي من فروع الكيمياء ، عدا فرع كيمياء

(أ) البيئه (ب) الموجات (ج) العقاقير (د) الغلاف الجوي

ملاحظات مهمة

لو الميزان الخطأ فيه بالزيادة نطرحها من الكتلة الموجودة لو بالنقصان يبقى هنجمعها

✓ اذا كانت نسبة الخطأ في الميزان $0.5 +$ ووضع كاس على الميزان فكانت كتلتها 6.5 g فكم تكون الكتلة الفعلية الخطا هنا بالزيادة يبقى هنطرح الكتلة تساوى 6
✓ فى عملية المعايرة توضع المادة المعلومة في السحاحة والمادة مجهولة التركيز فى الدورق المخروطى



١٠- عند نقل الكرة من المخبار المدرج (١) الى المخبار المدرج (٢)

قل حجم الماء في المخبار المدرج (١) بمقدار 10ml

ما مقدار ارتفاع في قراءه حجم الماء في المخبار المدرج (٢) .

(أ) 5Cm^3 (ب) 2.5Cm^3 (ج) 22.5Cm^3 (د) 10Cm^3

١٢- ما الاداه المستخدمه في تحضير محلول هيدروكسيد البوتاسيوم لاستخدامه في عمليه


تعيين تركيز محلول لحمض الكبريتيك ؟

(أ) السحاحه (ب) الدورق المستدير (ج) الكاس الزجاجي (د) الدورق العياري

١٣- الشكلين المقابل يعبران عن مقطع من اداه زجاجيه :

أ- ما اسم هذه الاداه ؟


ب- احسب حجم السائل المنقول من هذه الاداه الى دورق مخروطي.



١٤- يستخدم الجهاز الموضح في الشكل المقابل في قياس


حموضه او قاعديه التربيه الزراعيه

(أ) مانوع هذه التربيه مع التفسير



(ب) كيف تعالج هذه التربيه؟

تحويلات البادئات



لو بدات بكبير اضرب لو بدات بصغير اقسم

ترتيب البادئات تنازليا من الاكبر الى الاصغر
الوحدة < ديسى < سم < ملي < ميكرو < نانو

١٥- ما قيمه 0.03 s مقدره بوحده النانو ثانيه.

(أ) 3×10^9 (ب) 3×10^7 (ج) 3×10^5 (د) 3×10^3

١٦- سائل حجمه 15.7 ml ما مقدار هذا الحجم بوحده النانو لتر.....

(أ) 157 (ب) 6.62 (ج) 1.57×10^7 (د) 1.57×10^{-5}

١٧- اي من ازواج الكميات الاتيه متساويه الكتله ؟

(أ) $10^2 \mu\text{g} / 10^8 \text{ng}$ (ب) $10^8 \text{ng} / 0.1 \text{mg}$

(ج) $0.1 \text{mg} / 0.001 \text{g}$ (د) $10^2 \mu / 0.1 \text{mg}$

ملحوظه

الخواص النانوية علشان تظهر ليها شرطين

✓ الاول ان يكون البعد على مقياس النانو


✓ الثانى ان البعد النانوى هو الحجم النانوى الحرج يعنى من ١ الى ١٠٠ نانومتر

١٨ - اصغر وحده بنائيه من المادة هي

(أ) البللورة (ب) الانبوبة النانوية (ج) الجزيئ (د) الحمض الاميني

١٩ - ايا من الاحرف الموضحة على الشكل البياني المقابل

تعبّر عن الحجم الحرج لدقائق مادة نانوية.....



(أ) A (ب) B (ج) C (د) D

٢٠ - يلزم لوصف احد الدقائق بانها نانوية ان

(أ) تكون ذات بُعد واحد فقط (ب) يقدر طولها وعرضها على الاقل بمقياس نانوي

(ج) يكون لها طول وعرض وارتفاع (د) يكون لها بُعد واحد نانوي على الاقل

٢١ - انابيب الكربون النانوية اقوى من كل

(أ) الصلب والماس (ب) النحاس والماس (ج) الرصاص والماس (د) الصلب والنحاس

٢٢ - لماذا يفضل استخدام انابيب الكربون النانوية كعوامل حفازة في الصناعات الكيميائية؟.....

(أ) لان مساحه سطحها كبيره جدا (ب) لانها تحضر من ذرات كربون نشطه

(ج) لانها تحتوي على روابط تساهميه قويه (د) لانها تتخذ شكل اسطواني

فكرة


لو اعطى فى المسألة ثلاث ابعاد وطلب نوع المادة

لو بعد واحد على مقياس من (1- 100nm) يكون احادى البعد (اغشية رقيقة -اسلاك نانوية - الياف نانوية)

لو بعدين على مقياس من (1- 100nm) يكون ثنائى البعد (انابيب الكربون)

لو ثلاث ابعاد على مقياس من (1- 100nm) يكون ثلاثى البعد كرة البوكى او صدفه النانو

٢٣ - ما الابعاد المحتمله للشكل المقابل؟.....



| الاختيارات | الطول | العرض | الارتفاع |
|------------|--------|--------|----------|
| أ | 322 nm | 83 nm | 720 nm |
| ب | 179 nm | 180 nm | 11 nm |
| ج | 86 nm | 94 nm | 91 nm |
| د | 196 nm | 201 nm | 278 nm |

٢٤ - الجدول التالي يوضح أبعاد بعض المواد : تجريبى ٢٠٢٠

| المادة | البعد الأول | البعد الثانى | البعد الثالث |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| A | 50Cm | 50µm | 50nm |
| B | 50Cm | 50nm | 20nm |
| C | 50x10-9m | 50x10-9m | 500x10-10m |
| D | 50Cm | 50x10-6m | 50x10-9m |

أى من الأبعاد السابقة يعبر عن أسلاك النانو التى تستخدم فى الدوائر الالكترونية ؟

(أ) D - (ب) C - (ج) B - (د) A -

٢٥ - فى كرة البوكى ترتبط كل ذرة كربون بعدد ذرة كربون اخرى

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢٦ - تكون المادة ذات صلابة أكبر إذا كان قطر دقائقها هو

(أ) 5x10-9m (ب) 5x10-7m (ج) 5x10-5mm (د) 5x10-2µm

٢٧ - تستخدم كأجهزة استشعار بيولوجية أحد أبعادها 20mm يكون البعدان الآخران بالنانومتر

(أ) 10-5, 10-3 (ب) 40, 20 (ج) 105, 103 (د) 400, 20

٢٨ - توصيل جزيئات الكربون للتيار الكهربى يكون أكبر مايمكن عندما يكون حجم جزيئاته

(أ) 3x10-9m (ب) 25x10-4m (ج) 14x10-3m (د) 26x10-5m

٢٩ - العنصر الذى تصنع منه أسلاك نانوية خفيفة لجر الأجسام الثقيلة يكون

(أ) الألومنيوم (ب) الذهب (ج) الكربون (د) الحديد

٣٠ - يتجه العالم إلى تقليل الاحتياج إلى غسالات الملابس وذلك خلال إنتاج تجريبى ٢٠٢٠

(أ) أنسجة تتميز بالتنظيف الذاتى (ب) بخاخات للتغليف

(ج) - خزف يتميز بالتنظيف الذاتى (د) أنسجة ضد المطر

علاقات مهمة

حجم الدقائق والصلابة علاقة عكسية

حجم الدقائق وعدد ذرات السطح علاقة طردية

حجم الدقائق وعدد ذرات من الداخل علاقة عكسية

علاقة مساحة السطح مع الحجم علاقة ثابتة


الباب الثاني

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|----|----|----|-----|------|-----|----|
| Fe | Cu | Cl | Ca | K | Al | Li | S | Mg | p |
| 56 | 63.5 | 35.5 | 40 | 39 | 27 | 7 | 32 | 24 | 31 |
| Pb | Na | O | N | C | H | Ag | Zn | Ba | |
| 207 | 23 | 16 | 14 | 12 | 1 | 108 | 65.5 | 137 | |

المعادلة الكيميائية الموزونة

المعاملات هي عدد المولات في المعادلة الموزونة (الرقم اللى قبل المركب في المعادلة بعد وزنها

٣١- المعادله الكيميائيه لامقابله غير موزونه:



ما قيمه معامل الماء بعد موازنه المعادله

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

٣٢- في المعادله المقابله : $\text{XP}_4\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{YH}_3\text{PO}_3$

ما قيمه المعامل Y عندما تكون قيمه المعامل X تساوي ٢ ؟

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) لا توجد اجابة صحيحة

ازاي تكتب معادلة احتراق

❖ المركب + الاكسجين يعطى ثانى اكيد الكربون + الماء

❖ عدد مولات ثانى اكسيد الكربون الناتجة تساوى عدد ذرات الكربون فى المركب

❖ عدد مولات الماء الناتجة نصف عدد ذرات الهيدروجين فى المركب

بعد وزن الكربون والهيدروجين نحسب عدد ذرات الاكسجين فى النواتج

عدد معامل الاكسجين

لو المركب لا يحتوى على اكسجين = عدد الاكسجين ÷ ٢

لو الامركب يحتوى على اكسجين = عدد الاكسجين فى النواتج - عدد الاكسجين

فى المركب ÷ ٢

٣٣- يحترق $C_4H_8O_2$ المركب تماما في غاز O_2 مكونا غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار ماء. ما معامل الاكسجين في معادله الاحتراق الموزونه ؟

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

٣٤- ما معامل الميثانول CH_3OH في المعادله الموزونه المعبره عن احتراقه التام بالاكسجين؟

- (أ) $3/2$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

لو المعامل طلع كسر اضرب المعادلة كلها في 2

٣٥- عند حترق البيوتان C_4H_{10} يكون معامل الاكسجين

- (أ) ١٣ (ب) ٤ (ج) ١٥ (د) ٦

المعادلة الايونية

ملاحظات مهمة

أ- اذا كان التفاعل ترسيب تكون المعادلة النهائية هي معادلة تكوين الراسب

ب- اذا كان التفاعل تعادل بين حمض وقاعدة

اذا كان الحمض قوى والقاعدة قوية يكون الناتج $H_2O_{(L)}$ $OH^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} \rightarrow$

اذا كان الحمض قوى والقاعدة ضعيفة يكون الناتج نفكك الحمض فقط

اذا كان الحمض ضعيف والقاعدة قوية يكون الناتج نفكك القاعدة فقط

٣٦- اضيفت قطرات من هيدروكسيد الصوديوم الى كميته من الماء في انبوبة ..

ايا من الاختيارات الاتيه لن يكون من محتويات الانبوبة

- (أ) OH^- (ب) Na^+ (ج) $NaOH$ (د) Na^+, OH^-

٣٧- ما الايونات التي لا تكتب في المعادله الايونيه النهائيه لتفاعل محلول هيدروكسيد

البوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك.....

- (أ) K^+, H^+ (ب) H^+, OH^- (ج) K^+, Cl^- (د) H^+, Cl^-

الحساب الكيميائي

٣٨- ما عدد ذرات العناصر المكونه لوحده صيغه من بيكربونات الكالسيوم $Ca(HCO_3)_2$

- (أ) 9 atom (ب) 10 atom (ج) 11 atom (د) 12 atom

٣٩- يحتوي المول من ثاني كرومات البوتاسيوم على

- (أ) 1 mol K (ب) 4 mol Cr (ج) 7 mol O (د) 1 mol Cr

٤٠- إذا كانت الكتلة المولية من المركب $M(OH)_3$ تساوي $78g/mol$ فإن الكتلة الذرية الجرامية للعنصر M تساوي

(أ) $62 g$ (ب) $59 g$ (ج) $30 g$ (د) $27 g$

ازاي نحل مسائل الباب التاني؟؟؟؟؟؟

الطريقة المباشرة باستخدام القوانين


- ١- (المعطى والمطلوب من نفس المادة) يعنى يعطيك حاجة ويطلب حاجة من نفس الحاجة
- ٢- كلمة السر فى اى مسألة هى عدد المولات (دور على عدد المولات)
- ٣- علشان نجيب عدد المولات الرقم اللى عند فى المسألة اقسمه طب نقسمه على ايه ؟

لو الرقم اللي فى المسألة

بالجرام اقسم على الكتلة المولية لو بالجزئ اقسم على 6.02×10^{23} لو بالتر اقسم على 22.4 لتر

المطلوب (اللي عاوزه)

المعطى (الرقم اللي فى المسألة)



٤١- ما عدد الجزيئات فى عينه من الامونيا NH_3 كتلتها $43.5 g$ ؟

(أ) 2.26×10^{25} molecule (ب) 2.36×10^{23} molecule

(ج) 1.54×10^{24} molecule (د) 8.63×10^{-16} molecule

٤٢- المركب الذي تكون كتله الجزيء منه $2.93 \times 10^{-22} g$ تكون كتلته المولية

(أ) $0.1 g$ (ب) $9.97 \times 10^{-23} g$ (ج) $3.6 \times 10^{-23} g$ (د) $60 g$

٤٣- حجم 12.04×10^{23} molecule من غاز الهيدروجين (at STP) يساوي

(أ) $89.6 L$ (ب) $44.8 L$ (ج) $22.4 L$ (د) $2 L$

٤٤- اكبر كتله لغاز الاكسجين فيما يلي كتله

(أ) 1 molecule (ب) $11.2 L$ (ج) 1 mol (د) 1 atom

٤٥- ما كتله $0.25 L$ من الغاز (X) كتلته المولية $62.7 g/mol$

(أ) $0.69 g$ (ب) $0.35 g$ (ج) $0.07 g$ (د) $0.035 g$

٤٦ - عدد الجزيئات في 16g من غاز O₂ في STP تساوى نفس عدد الجزيئات في تجريبى ٢٠٢٠

أ- 40g من غاز الأرجون

ب- 20g من غاز النيون

ج- 22g من غاز CO₂

٤٧ - حجم 4 g من الهيدروجين في الظروف القياسية (STP) يساوي لتر

(أ) 2 (ب) 22.4 (ج) 44.8 (د) 89.6

٤٨ - عدد جزيئات ثاني أكسيد الكبريت الموجودة في 128 g منه تساوي

(أ) 2 (ب) 4.02×10^{23} (ج) 3.01×10^{23} (د) 12.04×10^{23}

٤٩ - الغاز الذي يكون حجم 0.6 جم منه 80 مليلتر في [STP] تكون كتلته المولية

(أ) 85 جم / مول (ب) 168 جم / مول (ج) 310 جم / مول (د) 340 جم / مول

٥٠ - عدد جزيئات ثاني أكسيد الكبريت الموجودة في 128 g منه تساوي

(أ) 2 (ب) 4.02×10^{23} (ج) 3.01×10^{23} (د) 12.04×10^{23}

٥١ - لديك بالونان : A بها غاز عدد مولاته 0.5mol ، B بها غاز عدد جزيئاته

3.01×10^{23} جزئ في STP فإن :

أ- حجم الغاز A ضعف حجم الغاز B

ب- حجم الغاز A = حجم الغاز B

ج- حجم الغاز A < حجم الغاز B

د- حجم الغاز A > حجم الغاز B

٥٢ - بالونين لهما نفس الحجم (at STP) الاول ممتلئ بغاز الهيليوم والآخر بغاز الأرجون

ايا من العبارات الاتيه تعبر تعبيراً صحيحاً عنهما

أ- بالون الهيليوم يحتوي على عدد من الذرات اكبر مما في بالون الأرجون.

ب- بالون الهيليوم يحتوي على عدد من الذرات اقل مما في بالون الأرجون.

ج- بالون الهيليوم يحتوي على نفس عدد الذرات الموجودة في بالون الأرجون.

د- بالون الهيليوم كتلته اكبر من كتله بالون الأرجون .

٥٣ - أبخرة الكبريت كتلتها 512g تكافئ

(أ) 2 مول (ب) 44.8 لتر (ج) 1.2×10^{24} ذرة (د) جميع ما سبق

٥٤ - 04×10^{23} ذرة يحتويها

(أ) المول من جزيئات الهيدروجين.

(ب) المول من ذرات الهيدروجين.

(ج) المول من الهليوم.

(د) المول من الجلوكوز (C₆H₁₂O₆)

٥٥ - ايا مما ياتي من تطبيقات فرض افوجادرو

أ- 11.2 L من غاز O₂ يحتوي على نفس عدد الجزيئات الموجوده في 11.2 L من غاز H₂

ب- اللتر من غاز Cl₂ يحتوي على نفس عدد الذرات الموجوده في لتر من غاز SO₂

ج- الحجم الذي يشغله 26 g من C₂H₂ اكبر من الحجم الذي يشغله 2 g من H₂

د- حجم 1 mol من غاز CH₄ اقل من حجم 1 mol من غاز NH₃

نحلى بالننا لو حببت تجيب الكتلة المولية للغازات اضرب الكتلة الذرية $\times 2$ (هاتى بك) هيدروجين - اكسجين - نتروجين- يود - بروم - كلور
لو هتجيب الكتلة المولية للفوسفور البخارى اضرب الكتلة الذرية $\times 4$ (31×4)
لو الكتلة المولية للكبريت البخارى اضرب الكتلة الذرية $\times 8$ (32×8)

قانون عدد الذرات

عدد الذرات = عدد المولات \times عدد الذرات فى الجزيئ $\times 10^{23} \times 6.02$

٥٦- عدد ذرات الـ (H) فى ربع مول من حمض الأسيتيك CH_3COOH تساوى

(أ) عدد افوجادرو (ب) نصف عدد افوجادرو

(ج) ضعف عدد افوجادرو (د) ثلاث امثال عدد افوجادرو

٥٧- عدد الذرات فى نصف مول من ثاني اكسيد الكربون عدد ذرات الموجوده فى نصف مول من اول اكسيد الكربون

(أ) اكبر من (ب) اصغر من (ج) يساوى (د) ضعف

٥٨- عدد ذرات الكربون الموجودة فى ١٥ جم من الفورمالدهيد (HCHO)

(أ) ضعف عدد افوجادرو (ب) عدد افوجادرو

(ج) نصف عدد افوجادرو (د) اربعة امثال عدد افوجادرو

٥٩- عينة من ثاني أكسيد النيتروجين NO_2 تحتوي على 1.25 mol فيكون عدد الذرات فيها ذرة.

(أ) 3 (ب) 3.75 (ج) 22.06×10^{23} (د) 22.575×10^{23}

٦٠- ما عدد ذرات الاكسجين فى ٠.١ mol من $\text{CuSO}_4.5\text{H}_2\text{O}$ ذرة

(أ) 2.41×10^{23} (ب) 5.42×10^{22} (ج) 6.02×10^{23} (د) 5.42×10^{23}

٦١- ما عدد ذرات الاكسجين فى ٠.١ mol من $\text{CuSO}_4.5\text{H}_2\text{O}$ ذرة

(أ) 2.41×10^{23} (ب) 5.42×10^{22} (ج) 6.02×10^{23} (د) 5.42×10^{23}

٦٢- عدد ذرات ٠.٥ mol من حمض الاسيتيك CH_3COOH يساوي

(أ) عدد افوجادرو (ب) ضعف عدد افوجادرو

(ج) اربعة امثال عدد افوجادرو (د) ثمانية امثال عدد افوجادرو

٦٣- عدد ذرات بخار الفسفور فى ١٠٠ g منه يساوي ذرة

(أ) 8.45×10^{25} (ب) 1.94×10^{24} (ج) 2.2×10^{23} (د) 4.85×10^{23}

٦٤- عدد الذرات فى ١.٢٥ mol من NO_2 يساوي ذرة

(أ) 22.575×10^{23} (ب) 18.06×10^{23} (ج) 3.75 (د) 3

٦٥ - احسب كتله كربونات الصوديوم التي تحتوي على 1.773×10^{17} atom من ذرات الكربون.

.....

.....

.....

قانون عدد الايونات

$$\text{عدد الايونات} = \text{عدد المولات} \times \text{عدد الايونات في الجزيء} \times 6.02 \times 10^{23}$$

٦٦ - عدد أيونات الصوديوم الناتجة من إذابة 71 g من Na_2SO_4 في الماء تساوي أيون
(أ) 2 (ب) 6.02×10^{23} (ج) 3.01×10^{23} (د) 12.04×10^{23}

٦٧ - عند ذوبان مول واحد من كلوريد الصوديوم NaCl في الماء يكون عدد الأيونات الكلية الناتجة
(أ) 6.02×10^{23} (ب) 3.01×10^{23} (ج) 12.04×10^{23} (د) ٢

٦٨ - إذا أذيب 1 mOl من كلوريد الكالسيوم CaCl_2 في الماء وتحول بالكامل إلى أيونات فإن عدد أيونات الكلوريد في المحلول تساوي أيون .

(أ) $0.5 \times 6.02 \times 10^{23}$ (ب) 6.02×10^{23} (ج) $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ (د) $3 \times 6.02 \times 10^{23}$

مسائل غير مباشرة (مسائل علاقات او معادلات)

المعطى من مادة والمطلوب من مادة ثانية

نعمل علاقة بين المعطى اللي عاطينى قيمته والمعطى اللي عاوزه ونعمل مقص

نحل باستخدام القوانين دى اسهل من طريقه المقص

$$\text{الكتلة} = \text{عدد المولات} \times \frac{\text{معامل المطلوب}}{\text{معامل المعطى}} : \text{الكتلة المولية}$$

$$\text{عدد الجزيئات} = \text{عدد المولات} \times \frac{\text{معامل المطلوب}}{\text{معامل المعطى}} \quad 6.02 \times 10^{23}$$

$$\text{الحجم} = \text{عدد المولات} \times \frac{\text{معامل المطلوب}}{\text{معامل المعطى}} \quad 22.4 \times$$

ملحوظة معامل المطلوب والمعطى هو عدد مولاتهم فى المعادلة (الرقم اللي اقلبهم فى المعادلة)

٦٩ - فى التفاعل التالى :



يكون حجم النشادر الناتج من تفاعل 14 g من النتروجين يساوى.....

(أ) حجم عدد افوجادرو من غاز النشادر (ب) نصف حجم عدد افوجادرو من النشادر

(ج) ضعف حجم عدد افوجادرو من جزيئات النشادر

٧٠- يتأكسد أكسيد الحديد II بسهولة في الهواء الساخن طبقا للمعادلة :




أكسيد الحديد II. (Fe=56,O=16) تجريبى ٢٠٢٠

٧٢- باستخدام المعادلة الآتية : $2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$ ، احسب عدد مولات غاز الأكسجين الناتج من تسخين 108.25g من أكسيد الزئبق. (Hg=200.5 , O=16).

٧٣- اذا علمت ان الهواء الجوي يحتوي على % 20 من حجمه اكسجين فما حجم الهواء اللازم للتفاعل مع 10 L من غاز SO₂ (at STP) ؟

٧٤- ايا من الاشكال البيانيه الاتيه تعبر عن قانون افوجادرو



٧٥- ايا مما ياتي من تطبيقات فرض افوجادرو

أ- 11.2 L من غاز O₂ يحتوي على نفس عدد الجزيئات الموجوده في 11.2 L من غاز H₂

ب- اللتر من غاز Cl₂ يحتوي على نفس عدد الذرات الموجوده في لتر من غاز SO₂

ج- الحجم الذي يشغله 26 g من C₂H₂ اكبر من الحجم الذي يشغله 2 g من H₂

د- حجم 1 mol من غاز CH₄ اقل من حجم 1 mol من غاز NH₃

٧٦- الغاز الذي يكون حجم 0.6 g منه 80 ml (at STP) تكون كتلته الموليه

85 g/mol (د)

168 g/mol (ج)

310 g/mol (ب)

340 g/mol (أ)



٧٧- تبعا للتفاعل

ما حجم غاز NO_2 الناتج من تفاعل 20 ml من غاز NO مع وفرة من غاز الاكسجين في نفس الظروف من الضغط ودرجه الحرارة

(أ) 10 ml (ب) 15 ml (ج) 20 ml (د) 30 ml

٧٨- عند تفاعل 14 g من غاز CO مع وفرة من الاكسجين .. فان حجم غاز CO_2 الناتج (STP) يساوي

(أ) 89.6 L (ب) 11.2 L (ج) 44.8 L (د) 22.4 L

٧٩- كتلة CaO الناتجة من انحلال 50 g من كربونات الكالسيوم CaCO_3 حرارياً g

(أ) 28 (ب) 82 (ج) 96 (د) 14

الماده المحدد للتفاعل

دى تعرفها ازاي حتى لو مش طلبها ؟.....لو جالك فى المسألة اكثر من قيمة بس يكونوا للمتفاعلات مثلا لما يقول عند تفاعل كذا مع كذا ويعطيك قيم لهم سواء القيم دى بالجرام لو اللتر او الجزئ اول حاجة تعملها تجيب عدد المولات زي ماقولنا فوق بنقسم القيم اللي عاطهاك

١- نعمل علاقه بين المتفاعلات

٢- ننزل المعاملات تحت كل واحد (الرقم اللي قبله فى المعادله)

٣- ننزل عدد المولات اللي جبتها من القسمة تحت كل واحد نعمل مقص

٤- اللي يعطى قيمة اقل يبقى هو العامل المحدد

٥- لو طلب قيمة للماده الناتجة نعمل علاقه بين الماده المحدده (اللي خلصت) والماده الناتجة

٦- لو طلب الكتلة المتبقية نعمل علاقه بين الماده المحددة والماده المتفاعلة التانيه ونحسب كتلتها

٧- كتلة الماده المتبقية = كتلة الماده المتفاعلة الاصلية - كتلة الماده المتفاعلة الفعلية

٨٠- عند تفاعل 22.4L من غاز الأكسجين مع 70 L من غاز الهيدروجين لتكوين بخار ماء ، فإن حجم غاز الهيدروجين المتبقي بدون تفاعل في (STP) يساوي L

(أ) 23.8 (ب) 25.2 (ج) 47.6 (د) 50.4

٨١- في المعادلة التالية $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ إذا احترق 12 g من الماغنسيوم في إناء يحتوي 32 g من غاز الأكسجين فإن الماده المحددة للتفاعل وكتلة أكسيد الماغنسيوم الناتج على الترتيب

(أ) الأكسجين - 20 g (ب) الماغنسيوم - 20 g

(ج) الأكسجين - 80 g (د) الماغنسيوم - 80 g

٨٢- عند خلط ٢٢.٤ لتر من غاز الهيدروجين مع ٥٠ لتر من غاز الأكسجين لتكوين الماء فإن حجم الأكسجين المتبقي دون تفاعل هو

(أ) ٢٧.٦ لتر (ب) ٣٨.٨ لتر (ج) ٢٢.٤ لتر (د) ١١.٢ لتر

٨٣- عند خلط ٤٤.٨ لتر من غاز النيتروجين مع ١٤٠ لتر من غاز الهيدروجين لتكوين غاز النشادر $(\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3)$ فإن حجم الهيدروجين المتبقي دون تفاعل هو

(أ) ٥.٦ لتر (ب) ١٣٤.٤ لتر (ج) ٢٢.٤ لتر (د) ٩٥.٢ لتر

٨٤- يحضر غاز الأمونيا تبعاً للمعادلة $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ فإذا خلط ٦٠٠ لتر من النيتروجين مع ٦٠٠ لتر من الهيدروجين . فإن حجم غاز الأمونيا الناتج =

(أ) ٦٠٠ لتر (ب) ٣٠٠ لتر (ج) ٤٠٠ لتر (د) ١٢٠٠ لتر

٨٥- عند تفاعل محلول يحتوى على 12.04×10^{23} جزئ من هيدروكسيد الصوديوم مع كمية من محلول حمض الهيدروكلوريك نتج 18g من الماء

طبقا للتفاعل التالى : $\text{NaOH(aq)} + \text{HCl(aq)} \longrightarrow \text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)}$
(فإن المادة المحددة للتفاعل

تجريبى ٢٠٢٠

٨٦- يحترق 20 ml من غاز CO في 40 ml من غاز O_2 في اناء مغلق .. تبعا للمعادلة :



ما الحجم الكلي للغازات في الاناء بعد انتهاء التفاعل (at STP)

(أ) 20 ml (ب) 40 ml (ج) 50 ml (د) 80 ml

النسبة المئوية

$$\text{النسبة المئوية للعنصر} \times \text{كتلة المركب} = \text{كتلة العنصر} \times 100\%$$

٨٧- احسب النسبة المئوية للاكسجين فى وحدة صيغة من كبريتات الالمونيوم

٨٨- اى من المركبات الاتية يكون النسبة المئوية الكتلية للهيدروجين اكبر مايمكن

(أ) H_2SO_4 (ب) H_2S (ج) H_2O

٨٩- النسبة المئوية لماء التبخر في كربونات الصوديوم المتهدرتة ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$)

(أ) 62.75 % (ب) 25.35 % (ج) 14.52 % (د) 7.14 %

٩٠- ما النسبة المئوية الكتلية للكلور في معدن الفانادينيت $\text{Pb}_5(\text{VO}_4)_3\text{Cl}$

(أ) 7.5 % (ب) 3 % (ج) 2.5 % (د) 1.13 %

٩١- ما النسبة المئوية الكتلية للحديد في اكسيد الحديد III

(أ) 0.72 % (ب) 28 % (ج) 30 % (د) 69.9 %

٩٢- ايا من هذه المركبات تكون النسبة المئوية الكتلية للكربون فيه هي الاكبر.

(أ) C_2H_2 (ب) C_2H_4 (ج) C_3H_8 (د) C_4H_{10}

٩٣- مركب يحتوي المول منه على 5 mol من ذرات الكربون و هي تمثل 40% من كتلة مكونات

المركب .. ما الكتلة المولية من هذا المركب


(أ) 30 g/mol (ب) 67 g/mol (ج) 150 g/mol (د) 210 g/mol

٩٤- احسب النسبة المئوية للهيدروجين في بيكربونات الصوديوم

.....

.....

.....



٩٦- ايا من المركبات الثلاثة الموضحة في الشكل المقابل

تحتوي على نيتروجين بنسبه منويه كتليه مقدارها % 46.7

مع التفسير بالحسابات الكيميائيه

٩٧- احسب كتله الحديد التي يمكن استخلاصها من عينه كتلتها g 2.4 من خام الهيماتيت Fe_2O_3 ..

علما بان النسبه المئوية الكتليه للاكسجين فيه تساوي % 30.1

الصيغة الاولى والصيغة الجزيئية

نضع رموز العناصر من الشمال بالترتيب وتحتها نسبة كل واحد في المسالة
نقسم على الكتله الذرية لكل عنصر هيعطى عدد المولات هيكون رقم غير صحيح
اقسم على اصغر رقم ليعطى رقم صحيح (لو اعطى رقم فيه نصف مثلا 2.5 اضرب كله في 2
نحدد الصيغة الاولى اكتب الرمز من الشمال وجانبه رقمه

$$\text{الصيغة الجزيئية} \times \text{كتلة الصيغة الاولى} = \text{الصيغة الاولى} \times \text{الكتلة المولية الجزيئية}$$

٩٨- إذا كانت الصيغة الأولى لمركب ما هي CH_2 والكتلة المولية الجزيئية له 42 جم فإن الصيغة الجزيئية لهذا المركب تكون



٩٩- عند اتحاد 36 g من الماغنسيوم مع 14 g من النيتروجين يتكون مركب صيغته



عند اتحاد % 56.36 من الفوسفور مع % 43.64 من الأكسجين يتكون مركب صيغته



١٠٠- ما الصيغة الاولى للمركب الذي صيغته الجزيئية $C_6H_3(NO_3)_3$



١٠١- ايا من المركبات الاتيه تكون الكتله الجراميه لصيغته الاولى هي الاكبر



١٠٢- ما الصيغة الكيميائية لأكسيد النيتروجين الذي يحتوي على % 63.64 نيتروجين



١٠٣- ما الصيغة الأولية لأكسيد الكبريت الذي يحتوي على 50 % كبريت

(أ) SO_3 (ب) SO_2 (ج) S_2O_4 (د) SO

١٠٤- الصيغة الأولية لمركب يتكون من العناصر X , Y , Z بنسب كتليه متساويه

(أ) X_3Y_2Z (ب) XY_2Z_3 (ج) XYZ (د) $X_6Y_3Z_2$

١٠٥- مركب كتلته المولية 88 g/mol ما الصيغة الأولية المحتمله له

(أ) CH_2 (ب) CH_2O (ج) CH_3O (د) C_2H_4O

١٠٦- مركب يتكون من ثلاث عناصر بالنسب الآتية. O = 32 % H = 8 % C = 60 %

ما الصيغة الجزيئية المحتمله لهذا المركب

(أ) $C_5H_8O_2$ (ب) C_5H_4O (ج) C_6HO_3 (د) C_7HO_4

١٠٧- مركب هيدروكربوني يكون عدد مولات ذرات الهيدروجين أربع أمثال عدد مولات ذرات الكربون

فتكون الصيغة الأولية.....

(أ) CH_2 (ب) CH_3 (ج) CH (د) CH_4

١٠٨- لصيغة الأولية لهذا المركب $CH_3 CH_2 CH_2 COOH$

(أ) $C_2H_2O_2$ (ب) $C_4H_2O_2$ (ج) C_2H_4O (د) OCH_2

١٠٩- إوجد الصيغة الأولية لمركب يتكون من ١٢.٠٤ × ١٠^{٢٣} كربون و ٤ جم هيدروجين

١١٠- استنتج الصيغة الأولية للمركب المقابل



١١١- عينه من مركب كتلتها 80 g تحتوي على 23 g كبريت والباقي اكسجين .. استنتج الصيغة الأولية

١١٢- استنتج الصيغة الجزيئية لمركب كتلته المولية 136 g/mol ويتكون من عناصر الكربون

والهيدروجين والاكسجين بالنسبه الموضحة بالجدول التالي :

| العنصر | C | H | O |
|-------------------------------|---------|--------|-------|
| الكتله الذريه الجراميه للعنصر | 12 g | 1 g | 16 g |
| النسبه المئويه الكتليه للعنصر | 70.59 % | 5.89 % | 23.52 |

$$\text{النسبة المئوية للناتج الفعلي} \times \text{الناتج النظري} = \text{الناتج الفعلي} \times 100\%$$

١١٣- يتفاعل 11.9 g من CHCl_3 مع وفرة من غاز الكلور لتكوين 10.2 g من مركب CCl_4 تبعاً للمعادلة: $2\text{CHCl}_3 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{CCl}_4 + 2\text{HCl}$

ما النسبة المئوية للناتج الفعلي

(أ) 100 % (ب) 33.2 % (ج) 66.5 % (د) 86 %

١١٤- يحترق 29 g من غاز البيوتان C_4H_{10} في وفرة من غاز الأكسجين مكوناً 0.9 g من بخار الماء

ما النسبة المئوية للناتج الفعلي من بخار الماء

(أ) 0.02 % (ب) 2 % (ج) 10 % (د) 36 %

١١٥- عند تفاعل 19 g من ثاني أكسيد الكبريت مع وفرة من الماء تكون 21.6 g من حمض الكبريتوز ..

تبعاً للمعادلة: $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$

احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي .

١١٦- أضافه احد الطلاب محلول يحتوي على 1 g من نترات الفضة الى محلول اخر يحتوي على 1 g من كلوريد الصوديوم فتكون راسب من كلوريد الفضة و وعند حساب كتلته بعد غسله وتجفيفه وجد انها تساوي 0.732 g .. احسب النسبة المئوية للناتج الفعلي من كلوريد الفضة

١١٧- من تفاعل احتراق الكربون حسب المعادلة: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

احسب كتله الكربون المحترق في وفرة من من الأكسجين ، اذا كانت النسبة المئوية للناتج الفعلي 89.3 % والحجم الفعلي من CO_2 (at STP) يساوي 10 L

الباب الثالث

أنواع المحاليل

١١٨ - عند اضافته سكر المائده الى الماء مع التقليب .. يتكون

(أ) مركب واحد (ب) مخلوط (ج) مركبين (د) مركب او مخلوط

١١٩ - ايا مما ياتي يمثل خليط

(أ) NaCl(L) (ب) NaCl(aq) (ج) H₂O(v) (د) H₂O(s)

١٢٠ - ما الحاله الفيزيائيه للمذيب في المملغم

(أ) غاز فقط (ب) سائل فقط (ج) صلب فقط (د) غاز او سائل او صلب

١٢١ - ايا من هذه المحاليل جيده التوصيل للتيار الكهربى

أ- محلول كلوريد الماغنيسيوم في الماء ب- محلول سكر الجلوكوز في الماء

ج- محلول سكر المائده في الكحول الايثيلي د- محلول اليود في الكحول الايثيلي

١٢٢ - ايا من المواد الاتيه تتواجد في المحاليل المائيه في صورة جزيئات

(أ) C₆H₁₂O₆ , C₂H₅OH (ب) C₂H₅OH , K₃PO₄

(ج) CH₃COONa , C₆H₁₂O₆ , K₃PO₄ (د) CH₃COONa , C₆H₁₂O₆ , C₂H₅OH

١٢٣ - اذا كانت ذوبانيه احد الاملاح في الماء (20 g / 100 g H₂O) عند درجه حراره معينه ..

فما كتلة الملح اللازم اضافته الى 300 g من الماء للحصول على محلول مشبع عند نفس درجه

الحراره

(أ) 20 g (ب) 40 g (ج) 60 g (د) 80 g

١٢٤ - الشكل المقابل يوضح التغير في ذوبانيه ثلاث مواد (A) , (B) , (C) في الماء نتيجه

التغير في درجه الحراره

أ- ايا من هذه المواد تزداد ذوبانيته زياده ملحوظه


برفع درجه الحراره ؟

ب- عند ايا درجه حراره تكون ذوبانيه ماده (A)

اكبر ما يمكن

ج- ما كتله ماده (B) اللازمه لتكوين محلول مشبع

عند ذوبانها في 100 g من الماء عند درجه حراره 70 °C



النسبة المئوية (التركيز المئوي) \times كتلة المحلول = كتلة المذاب $\times 100\%$

١٢٥- ما التركيز المئوي لمحلول سكر السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ يحتوي اللتر منه على مول من المذاب


(أ) 100% (ب) 34.2% (ج) 6.84 % (د) 115 ml

١٢٦- زجاجة من حمض الكبريتيك مكتوب عليها 12% وحجمها 125 ml فان حجم الماء

(أ) 15 ml (ب) 110 ml (ج) 140 ml (د) 115 ml

١٢٧ عند اذابة 15 ml من الايثانول في 90 g من الماء يكون تركيز المحلول.....

(أ) 75 % (ب) 25 % (ج) 20 % (د) 80 %



١٢٨- من الشكل البياني المقابل ..

ما التركيز المئوي الكلي للمحلول المشبع عند 20 oC

(أ) 20% (ب) 23.1%

(ج) 42.8% (د) 30%

١٢٩- ما كتله محلول سكر الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ الذي يحتوي على 1 mol من المذاب وتركيزه

10%

(أ) 1 kg (ب) 1.8 kg (ج) 200 g (د) 900 g

التركيز المولاري

بالتعامل مع حجم المحلول باللتر لو الحجم ml نقسم على 1000

حجم المحلول = حجم المذاب + حجم المذيب

كتلة المادة المذابة = الكتلة المولية \times التركيز \times الحجم باللتر

قانون التركيز المولاري

١- مسائل تعويض مباشر في القانون

١٣٠- عند اذابة 20g هيدروكسيد صوديوم في كمية من الماء ثم اكمل المحلول إلى 250 ml يكون التركيز

(أ) ٠.٢٥ (ب) ٢ (ج) ٠.٥ (د) ١

١٣١- اللتر من محلول 0.25 M من الصودا الكاوية يحتوي علي من NaOH.

(أ) 4 mol (ب) 0.25 mol (ج) 10 g (د) 20 g

١٣٢- اذيب 58.5 g من كلوريد الصوديوم في كمية من الماء لعمل محلول حجمه 0.5 L ما تركيز المحلول الناتج .

(أ) 1/4 M (ب) 1/2 M (ج) 1 M (د) 2 M

١٣٣- يحتوي اللتر من الصودا الكاوية NaOH تركيزه 0.25 M على كل مما يأتي من NaOH

(أ) 5.6 L (ب) 10 g (ج) 0.25 mol (د) 1.505 x 10²³ molecule

١٣٤- ما كتله مركب $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ اللازمه لعمل محلول مائي حجمه 200 mL وتركيزه 0.1 mol/L

(أ) 3.16 g (ب) 4.96 g (ج) 24.8 g (د) 31.6 g

١٣٥- كتله كربونات الصوديوم اللازمه لتحضير 500 mL من محلول تركيزه 0.5

(أ) 10000 g (ب) 106 g (ج) 40 g (د) 26.5 g

١٣٦- محلول مائي من السكروز (كتلته المولية 342 g/mol) يحتوي على 123 g من المذاب وتركيزه المولاري 0.55 M ما حجم هذا المحلول

(أ) 66 mL (ب) 220 mL (ج) 340 mL (د) 654 mL

لاحظ

- لو قال محلول مولاري يبقى كتلة المذاب الكتلة المولية وحجم المحلول 1000ml
- اذا كان المذاب واحد مول يبقى كتلة المذاب هي الكتلة المولية
- اذا كان المذاب ماء يكون حجم المحلول هي كتلة المحلول = 1000 g

١٣٧- التركيز المئوي لمحلول مولاري من حمض الكبريتيك H_2SO_4 يساوي

(أ) 0.098% (ب) 0.98% (ج) 9.8% (د) 98%

١٣٨- محلول يحتوي على ربع مول من المذاب لتكوين محلول حجمه ٢٥٠ مل يكون تركيزه

(أ) مولاري (ب) ربع مولاري (ج) نصف مولاري (د) ثلث مولاري

فكرة الحل : نحسب عدد مولات كل محلول من القانون

عدد المولات = التركيز × الحجم باللتر

١٣٩- أيا من المحاليل الآتية يحتوي على 0.1 mol من هيدروكسيد الصوديوم؟

(أ) 1 mL من محلول تركيزه 0.1 M (ب) 10 mL من محلول تركيزه 0.1 M

(ج) 100 mL من محلول تركيزه 1 M (د) 1000 mL من محلول تركيزه 1 M

١٤٠- أيا من المحاليل الآتية يحتوي على العدد الاكبر من مولات المذاب

(أ) 10 mL من محلول NaCl تركيزه 0.5 mol/L

(ب) 20 mL من محلول NaCl تركيزه 0.4mol/L

(ج) 30 mL من محلول NaCl تركيزه 0.3 mol/L

(د) 40 mL من محلول NaCl تركيزه 0.2 mol/L

لاحظ

- جزيئات الالكتروليتات القوية تعطى ايونات فقط (لأنها تامة التاين في الماء)
- وجزيئات الالكتروليتات الضعيفة تعطى ايونات وجزيئات (لأنها غير تامة التاين في الماء)
- اللالكتروليتات تعطى جزيئات فقط لأنها لا تتاين

- ١٤١- يحتوي المحلول المائي لهيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) علي:
- (أ) أيونات (OH⁻) وجزيئات (K₂O) .
 (ب) أيونات (OH⁻) ، (K⁺) فقط .
 (ج) أيونات (OH⁻) ، (K⁺) وجزيئات (K₂O) .
 (د) أيونات (OH⁻) ، (K⁺) وجزيئات (KOH) .

لو طلب تركيز الأيون داخل مركب نحسب تركيز المركب المذاب ونجيب تركيز الأيون من القانون ده

تركيز الأيون = عدد الايون في المركب × تركيز المركب

- ١٤٢- ما تركيز ايونات الكلوريد في محلول حجمه 1 L مذاب فيه 2.08 g من ملح BaCl₂
- (أ) 0.01 M (ب) 0.012 M (ج) 0.02 M (د) 2.08 M

فكره النقطة التالية

- نقسم عدد المولات على الحجم باللتر يعطينا تركيز المادة المذابة
- لكن مطلوب تركيز ايونات الامونيوم المركب يحتوى على ٢ ايون امونيوم نضرب تركيز المادة في عدد ايونات الامونيوم

- ١٤٣- محلول حجمه 200 mL يحتوي على 0.04 mol من (NH₄)₂Ni(SO₄)₂·6H₂O ما تركيز ايونات الامونيوم NH₄⁺ فيه


- (أ) 0.0004 M (ب) 0.008 M (ج) 0.2 M (د) 0.4 M

- ١٤٤- التركيز المئوي لمحلول مولاري من حمض الكبريتيك H₂SO₄ يساوي
- (أ) 0.098% (ب) 0.98% (ج) 9.8% (د) 98%

فكرة السؤال

- من الشكل الذوبانية 40 oC عند تساوى 60 وده معناه ان المذيب 60 والمذيب 100 يبقى والكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم 40 نعوض في قانون التركيز المولالي

- ١٤٥- من الشكل البياني المقابل .. ما تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم عند 40 درجة kg/مول



التركيز المولالي

كتلة المادة المذابة = الكتلة المولية × التركيز × كتلة المذاب kg

بتعامل مع حجم المذيب ب kg لو الكتلة ب g نقسم على 1000

عدد المولات = كتلة المذيب kg × التركيز

١٤٦ - عند ذوبان 18 g من سكر الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ في 100 g من H_2O يتكون محلول سكري تركيزه

(أ) 1 m (ب) 0.01 M (ج) 15.3 % (د) (أ) ، (ج) معاً .

١٤٧ - احسب التركيز المولالي للمحلول المحضر بإذابة 53g كربونات صوديوم في 400g من الماء

١٤٨ - المحلول المولالي يحتوي على 1 mol من المذاب في

(أ) 22.4 L من المحلول (ب) 1000 g من المذيب (ج) 1 L من المحلول (د) 1 L من المذيب

١٤٩ - ما التركيز المولالي للمحلول الناتج من اذابه 6.44 g من النفثالين ($C_{10}H_8$) في 80 g من البنزين

(أ) 0.625 m (ب) 0.8 m (ج) 1.13 m (د) 80.4 m

١٥٠ - محلول مائي من كلوريد الصوديوم كتلته المولية 58.5 g/mol وتركيزه المولالي 3.14 m و كتله الماء فيه 2314 g ما كتله NaCl في هذا المحلول

(أ) 124.3 g (ب) 255.6 g (ج) 425 g (د) 726.6 g

قانون التخفيف

$$\text{الحجم} \times \text{التركيز} = (\text{قبل التخفيف}) = \text{الحجم} \times \text{التركيز} (\text{بعد التخفيف})$$

١٥١ - ما حجم الماء اللازم اضافته الى 328 g من NaOH لعمل محلول تركيزه 1.35 m

(أ) 6.07 L (ب) 7.44 L (ج) 11.1 L (د) 14.5 L

١٥٢ - حمض كبريتيك تركيزه 5 mol/L تم تخفيفه من 1L الي 10 L ما التركيز المولالي للحمض المخفف

(أ) 0.1 M (ب) 0.5 M (ج) 1 M (د) 5 M

١٥٣ - 10 mL من حمض الهيدروكلوريك تركيزه 6 M تم تخفيفه بالماء حتى اصبح تركيزه 0.5 M ما حجم الماء المضاف

(أ) 50 mL (ب) 110 mL (ج) 120 mL (د) 290 mL

١٥٤ - ما حجم الماء اللازم اضافته الى 500 mL من محلول مولاري من ملح الطعام لتحويله الى محلول تركيزه 0.1 M

(أ) 100 mL (ب) 1000 mL (ج) 4.5 mL (د) 5 L

زويل في الكيمياء

الخواص الجمعية للمحلول

علاقة عدد مولات الايونات والتركيز



١٥٥- تعتمد الخواص الجمعية للمحاليل على

(أ) طبيعة المذيب (ب) طبيعة المذاب (ج) عدد دقائق المذيب (د) عدد دقائق المذاب

١٥٦- ايا من المحاليل التالية يكون له الاثر الاكبر في انخفاض الضغط البخاري للماء عند ذوبان 1 mol منه في لتر من الماء

(أ) KCl (ب) MgCl₂ (ج) C₆H₁₂O₆ (د) KBr

١٥٧- ايا من المحاليل الاتية - متساوية التركيز المولالي - يكون ضغطه البخاري هو الاقل

(أ) محلول حمض الاسيتيك (ب) محلول كلوريد البوتاسيوم

(ج) محلول فوسفات الصوديوم (د) محلول كبريتات الصوديوم

١٥٨- اذيب مقدار من الزيت في كتله معلومه من البنزين النقي ، فاذا كان الضغط البخاري للبنزين

750 mm Hg فما مقدار الضغط البخاري للمحلول


(أ) 760 mm Hg (ب) 750 mm Hg (ج) 731.5 mm Hg (د) 75 mm Hg

١٥٩- يجمع غاز الهيدروجين عند تحضيره في المعمل بازاحه الماء لاسفل و يكون الضغط الناشئ

على سطح الماء هو مجموع ضغط الهيدروجين و ضغط

(أ) غاز اكسجين (ب) بخار الماء (ج) الهيدروجين المذاب في الماء (د) الغازات الخاملة الموجوده بالهواء

١٦٠- احد هذه الاشكال يوضح العلاقة بين عدد الجزئيات المتطايرة والضغط البخارى فى اناء مغلق



١٦١- درجة غليان محلول السكر في الماء درجة غليان الماء النقي .

(أ) اعلي من (ب) أقل من (ج) تساوي .

١٦٢- ايا من المحاليل المائيه الاتيه - متساوية التركيز المولي - تكون درجه غليانه هي الاكبر

(أ) CaCl₂(aq) (ب) NaNO₃(aq) (ج) CH₃COOH(aq) (د) Al(NO₃)₃(aq)


١٦٣- الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة

بين درجه الغليان والضغط البخاري

لاربعة محاليل مختلفه

ايا من الاختيارات التالية تعبر عن المحلول المشار اليه بالحرف A .

(أ) BaCl₂ (ب) C₆H₁₂O₆ (ج) C₁₂H₂₂O₁₁ (د) NaCl



لاحظ

- درجة غليان المادة الصلبة تختلف عن درجة غليان هذه المادة في محلولها
 - فيكون درجة غليان المادة في محلولها اكبر من درجة غليان (الماء ١٠٠ درجة مئوية)
- ١٦٤ - مادة صلبة (X) درجة غليانها 948°C تذوب في الماء مكونة محلول قد تكون درجة غليانه درجة مئوية
- (أ) 98 . (ب) 102 (ج) 946 (د) 950 .

لاحظ

- تزداد درجة الغليان المحلول بمقدار 0.5°C لكل مول من الايونات ... فوسفات البوتاسيوم بها ٤ مولات ايونات . اذن تزداد درجة الغليان بمقدار $2 \times 0.5 = 2$ درجة
- ١٦٥ - اذا تغيرت درجة غليان المول من الماء بمقدار 0.5°C عند اذابه مول من ايونات المذاب فيه فان درجة غليان المحلول المولالي من فوسفات البوتاسيوم .. تساوي درجة
- (أ) 100.5 (ب) 99.5 (ج) 100 (د) 102 .

لاحظ

- درجة تجمد اى مادة تقل بزيادة عدد مولات الايونات (علاقة عكسية)
مول السكر يعطى مول واحد لانه لايتاين
العلاقة بين مقدار الانخفاض فى درجة التجمد وعدد مولات الايونات علاقة طردية
- ١٦٦ - مقدار الانخفاض درجة تجمد محلول مائي من سكر الجلوكوز درجة تجمد محلول مائي من NaCl عند تساوي تركيزهما .
- (أ) تساوي (ب) نصف (ج) ضعف (د) ثلاثة أضعاف .
- ١٦٧ - درجة تجمد 2 مولر من ملح الطعام درجة تجمد 1 مولر من كلوريد الحديد III
- (أ) نصف (ب) ضعف (ج) يساوى (د) ثلاث امثال

درجة التجمد = عدد مولات الايونات $\times 1.86$

١٦٨ - درجة تجمد كبريتات الامونيوم.....

(أ) 27.9 - (ب) 5.58 - (ج) 1.86 - (د) 5.85 -

لاحظ

- ❖ لو اعطاك كتلة مادة مذابة وكتلة مذاب وطلب درجة التجمد هات التركيز المولالى وعوض فى القانون
- ❖ نحسب الكتلة المولية نحسب عدد المولات كتلة الماده المذابة على الكتلة المولية
- ❖ نحسب التركيز المولالى عدد المولات على كتلة المذيب kg

درجة التجمد = التركيز المولالى x عدد مولات الايونات - 1.86

١٦٩- درجة تجمد محلول كبريتات الامونيوم يحتوي على 396 g من الملح في 1000 g ماء تساوي.....درجه

- (أ) -1.86 (ب) 2.72 (ج) -16.74 (د) -27.9
١٧٠- عند ذوبان 50 g من كربونات الكالسيوم فى 1000 g من الماء يكون درجة تجمد المحلول
(أ) -1.86 (ب) -0.93 (ج) -3.72

فكرة الحل

المول من $MgCl_2$ كتلته ٩٦ جرام
وبها ٣ مولات ايونات فيكون درجة تجمده $3 \times 1.86 = 5.58$
٩٦ جرام
١١.١٦-
س

١٧١- كم جراما كلوريد الماعنسيوم يلزم اضافته الى 1000 g من ماء نقي لى يتجمد المحلول عند - 11.16

- (أ) 111 g (ب) 190 g (ج) 150 g (د) 3 g
١٧٢- ايا من المحاليل الاتيه متساويه التركيز يكون درجه تجمده هو الاقل
(أ) $NaCl(aq)$ (ب) $C_6H_{12}O_6(aq)$ (ج) $FeCl_3(aq)$ (د) $BaCl_2(aq)$
١٧٣- ايا من المحاليل الاتيه متساويه التركيز يتجمد اولا

- (أ) محلول سكر الجلوكوز (ب) محلول كربونات الصوديوم
(ج) محلول كلوريد الصوديوم (د) محلول فوسفات الصوديوم
١٧٤- ايا من المحاليل المائيه الاتيه - متساويه التركيز المولالى - يفضل استخدامه في منع تكون الجليد على رصيف المشاه في البلاد الباردة

- (أ) $C_6H_{12}O_6$ (ب) $NaBr$ (ج) KNO_3 (د) $CaCl_2$
١٧٥- ايا من المحاليل المائيه الاتيه تكون درجه تجمده هي الاقرب الى درجه تجمد محلول مائي من $C_{12}H_{22}O_{11}$ تركيزه 0.3 m
(أ) 0.075 m $AlCl_3$ (ب) 0.15 m $CuCl$ (ج) 0.3 m $NaCl$ (د) 0.6 m $C_6H_{12}O_6$

١٧٦ - اضيف قليلا من ملح كلوريد الصوديوم الي ماء نقي ما اثر ذلك على كل من درجتي تجمد وغليان الماء

(أ) ترتفع كل من درجة التجمد ودرجة الغليان (ب) ترتفع درجة التجمد وتنخفض درجة الغليان
(ج) تنخفض كل من درجة التجمد ودرجة الغليان (د) تنخفض درجة التجمد وترتفع درجة الغليان
١٧٧ - اذا كانت درجة تجمد محلول واحد مولر من كلوريد العنصر X تساوى - 3.72 تكون

صيغة كلوريد العنصر هي

(أ) XCl_3 (ب) XCl_2 (ج) X_2Cl_3 (د) XCl


١٧٨ - ايا مما ياتي لا يعتبر من الغرويات

(أ) مسحوق لبن البودره في الماء (ب) دقائق الغبار في الهواء

(ج) مسحوق نترات الكالسيوم في الماء (د) الدهون

١٧٩ - فقاعات الصابون تعتبر من الانظمه التي ينتشر فيها

(أ) غاز في غاز (ب) غاز في سائل (ج) سائل في غاز (د) غاز في صلب



١٨٠ - عند اضافته السائل (X) الى خليط زيت زيتون وماء

يتكون الخليط (Y) - كما بالشكل - وهو يعرف باسم

(أ) مستحلب الزيت والماء (ب) مملغم الزيت والماء
(ج) محلول الزيت في الماء (د) معلق الزيت و الماء

١٨١ - تعتبر سبيكة النيكل كروم من امثلة

(أ) المحاليل (ب) الغرويات (ج) المعلقات (د) المخليط الغير متجانسة

١٨٢ - الجبن و جل الشعر والجيلاتين مخاليط

(أ) يذوب فيها سائل في صلب (ب) ينتشر فيها سائل في صلب

(ج) يذوب فيها صلب في سائل (د) ينتشر فيها صلب في سائل

١٨٣ - يتكون مخلوط السكر في الكيوسين من دقائق قطر كل منها قد يساوي


(أ) 10000 nm (ب) 980 nm (ج) 100 nm (د) 0.1 nm

١٨٤ - عند اضافته محلول هيدروكسيد الصوديوم الى محلول حمض الهيدروكلوريك يتكون

(أ) مخلوط يمكن تمييز مكوناته بالمجهر (ب) مرئيه معلق متجانس ظاهريا
(ج) محلول قطره دقائقه اقل من 1nm (د) مخلوط متجانس يمكن فصل دقائقه

بالترشيح

١٨٥ - في ايا من الكؤوس الاتيه يتشتت الضوء عند مروره في السائل




طرق فصل المخاليط

١٨٦ - ما الطريقه المناسبه لفصل ماده (X) عن الماء من الخليط


الموضح بالشكل المقابل

(أ) التقطير البسيط (ب) التبخير

(ج) الترشيح (د) الفصل المغناطيسي



١٨٧- ما الخليط الذي يمكن فصل مكوناته بالطريقة الموضحة بالشكل المقابل



(أ) نحاس و محلول مائي من كلوريد نحاس II

(ب) محلول كلوريد نحاس وكلوريد صوديوم

(ج) ماء كحول ايثيلي

(د) ايثيلين جليكول وماء

١٨٨- ايا من طرق الفصل الاتيه تثبت ان كلوريد الصوديوم يعمل كمذاب في ماء البحر
(أ) التكتيف (ب) التقطير التجزيئي (ج) التبخير (د) الترشيح

قاعدة برونشتد ولورى



مهمة

لو اعطاك حمض او حمض مرافق وطلب قاعد او قاعدة مرافقة (نقص H وزود اشارة سالبة)
لو اعطاك قاعد او قاعدة مرافقة وطلب حمض او حمض مرافق (زود H ونقص اشارة سالبة)

١٨٩- فى تفاعل الأمونيا مع حمض الهيدروكلوريك يعتبر أيون الأمونيوم

(أ) حمض مرافق (ب) قاعدة (ج) قاعدة مرافقة (د) حمض

١٩٠- أحد الأزواج التالية لا يكون زوجًا مترافقًا حسب مفهوم برونستد - لوري للأحماض والقواعد

(ب) OH^- ، NaOH

(أ) NH_3 ، NH_4^+

(د) H_2S ، HS^-

(ج) OH^- ، H_2O

١٩١- جميع الأنواع التالية يعتبر حمضًا حسب مفهوم برونستد - لوري عدا :

(أ) H_2O (ب) NH_4^+ (ج) HSO_4^- (د) Ag^+

١٩٢- الحمض المرافق لـ HSO_4^-

(أ) H_2SO_4 (ب) NH_4^+ (ج) SO_4^{2-} (د) SO_4^-

١٩٣- كل مما ياتي من احماض برونشتد - لوري .. عدا

(أ) CH_3COO^- (ب) HCO_3^- (ج) HSO_3^- (د) NH_4^+

١٩٤- لا تطبق نظريه ارهينيوس فى تعريف الحمض على

(أ) HF فى الماء (ب) HCl فى الماء (ج) HSO_4^- (aq) (د) I_2 فى ثنائي كلورو ايثان

١٩٥- اضافته حمض HCl الى الماء النقي يسبب

(أ) زيادة تركيز كلا من H^+ ، OH^- (ب) زيادة تركيز H^+ وخفض تركيز OH^-

(ج) خفض تركيز كلا من H^+ ، OH^- (د) خفض H^+ و زيادة تركيز OH^-

١٩٦- الحمض المرافق للقاعدة HASO_4^{2-} هو

(أ) H_3O^+ (ب) AsO_4^{3-} (ج) H_3AsO_4 (د) H_2As^{4+}

- ١٩٧- ما القاعده المرافقه للحمض $H_2BO_3^-$
 (أ) BO_3^{3-} (ب) H_3BO_3 (ج) HBO_3^{2-} (د) $H_3BO_2^+$
 ١٩٨- يعمل الماء كحمض برونشتد - لوري عند تفاعله مع
 (أ) NH_3 (ب) H_2S (ج) HCN (د) HNO_3
 ١٩٩- ايا من الازواج الاتيه تمثل قاعده والحمض المرافق لها
 (أ) HCl , OCl^- (ب) H_2SO_4 , SO_4^{2-} (ج) NH_3 , NH_4^+ (د) H_3O^+ , OH^-
 ٢٠٠- حدد الحمض المرافق والقاعدة المرافقة لكلا من المعادلتين التاليتين
 $CH_3COOH_{(aq)} + NH_{3(g)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + NH_4^+_{(aq)}$
 $HCO_3^-_{(aq)} + H_2O_{(L)} \rightleftharpoons OH^-_{(aq)} + H_2CO_{3(aq)}$
 ٢٠١- كل مما ياتي من احماض برونشتد - لوري .. عدا
 (أ) CH_3COO^- (ب) HCO_3^- (ج) HSO_3^- (د) NH_4^+
 ٢٠٣- أحد الأنواع التالية لا يعتبر حمضاً حسب مفهوم برونشتد - لوري :
 (أ) H_2O (ب) NH_4^+ (ج) HSO_4^- (د) Ag^+
 أحد الأزواج التالية لا يكون زوجاً مترافقاً حسب مفهوم برونشتد - لوري للأحماض والقواعد
 (أ) NH_3 , NH_4^+ (ب) OH^- , $NaOH$ (ج) H_2S , HS^- (د) OH^- , H_2O
 ٢٠٤- طبقاً لنظريه برونشتد - لوري لابد ان يحتوي خليط الماء مع حمض النيتريك على
 (أ) NH_3 (ب) H_2S (ج) HCN (د) HNO_3
 ٢٠٥- ما القاعده المرافقه للايون HSO_4^-
 (أ) $H_2O_{(L)}$ (ب) $H_3O^+_{(aq)}$ (ج) $H_2SO_{4(aq)}$ (د) $SO_4^{2-}_{(aq)}$
 ٢٠٦- يتشابه حمض برونشتد - لوري مع حمض أرهينيوس في أحتوائه على
 (أ) زوج من الإلكترونات الحرة . (ب) الهيدروجين . (ج) مجموعة OH^- (د) (أ) ، (ب) معاً .
 ٢٠٧- الصيغة الكيميائية للقاعدة المرافقة للماء هي :
 (أ) OH^- (ب) OH^- (ج) H_3O^+ (د) O^{2-}
 ٢٠٨- ايا مما ياتي يمكن ان يقوم بدور كل من حمض وقاعده برونشتد لوري
 (أ) CH_3COOH (ب) NO_3^- (ج) $H_2PO_4^-$ (د) OH^-
 ٢٠٩- قاعدية انيون الهيدريد H^- اقوى من قاعدية انيون الهيدروكسيد OH^- ،
 لذا فانه عند تفاعل انيون H^- مع الماء يتكون
 (أ) $H_3O^+_{(aq)}$ (ب) $OH^-_{(aq)} + H_{2(g)}$ (ج) $OH^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)}$ (د) $H_2O_{2(aq)}$

نظرية لويس

حمض لويس مركبات البريليوم والبورون والالومنيوم الايونات الموجبة اكسيد الفلزات
 قاعدة لويس مركبات الاكسجين والنيتروجين والفوسفور الايونات السالبة اكسيد الفلزات


٢١١- قاعده لويس

- لا بد ان تكون جزئ متعادل
 (ب) لا بد ان تكون ايون مشحون
 (ج) يحتمل ان تكون جزئ متعادل او ايون
 (د) لا بد ان تكون ذره متعادله

٢١٢- كل قواعد برونشتد لوري

- (أ) قواعد لويس
 (ب) تختلف عن قواعد لويس
 (ج) احماض لويس
 (د) لا توجد اجابه صحيحه

- ٢١٣- ايا من العبارات الاتيه تعتبر غير صحيحه بالنسبه للتعريفات المختلفه للقاعده
 (أ) تمنح OH- في وسط مائي (ب) تستقبل بروتون في وسط مائي
 (ج) تمنح زوج من الالكترونات الحره (د) تستقبل زوج من الالكترونات الحره
 ٢١٤- يذوب غاز الفوسفين في الماء تبعا للتفاعل :




طبقا لنظريه لويس .. ايا من الاختيارات التاليه يعتبر صحيحا

- (أ) PH_3 يمثل القاعدة لانه يمنح زوجا من الالكترونات الحره للماء
 (ب) H_2O يمثل الحمض لانه يمنح زوجا من الالكترونات الحره للفوسفين
 (ج) PH_3 يمثل الحمض لانه يستقبل زوجا من الالكترونات الحره من الماء
 (د) H_2O يمثل القاعده لانه يستقبل زوجا من الالكترونات الحره من الفوسفين

تصنيف الاحماض والقواعد

| الحمض العضوى | الحمض المعدنى | تكوينه |
|-------------------------------|--|--------------|
| اخره $COOH$ | اوله H | القوه والضعف |
| جميع الاحماض العضويه ضعيفه | معظم الاحماض المعدنيه قويه ماعدا (كف) كربونيك وفوسفورك | القاعديه |
| عدد مجموعات الكربوكسيل $COOH$ | عدد ذرات الهيدروجين | |



٢١٥- يعتبر حمض الفيثاليك

- (ب) معدنى احدى القاعديه
 (د) معدنى ثنائى القاعديه

- (أ) عضوى احدى القاعديه
 (ج) عضوى ثنائى القاعديه

٢١٦- جميع ما يلى احماض معدنيه ما عدا حمض

- (أ) الكبريتيك (ب) الفوسفوريك (ج) الستريك (د) الهيدروكلوريك

٢١٧- حمض النيتريك من الأحماض

- (أ) ضعيفه (ب) المعدنيه (ج) العضويه (د) ثنائى القاعديه

٢١٨- الأحماض التاليه جميعها قويه ما عدا

- (أ) HB (ب) H_2CO_3 (ج) $HClO_4$ (د) HNO_3


٢١٩- أحد الأحماض التاليه لا يعتبر من الأحماض ثنائيه البروتون :

- (أ) H_2SO_4 (ب) H_2SO_3 (ج) H_2CO_3 (د) $HCOOH$


٢٢٠- ايا من المحاليل الاتيه متساويه التركيز تكون اكثر قدره على التوصيل الكهربى

- (أ) H_2S (ب) H_2SO_4 (ج) H_2SO_3 (د) H_2CO_3

٢٢١- ايا من الاشكال البيانيه الاتيه يعبر عن تاين حمض ضعيف احادي القاعديه HA



٢٢٢- يصنف الحمض الموضح بالشكل المقابل على انه




- (أ) حمض قوي احادي القاعديه
(ب) حمض ضعيف احادي القاعديه
(ج) حمض ضعيف ثلاثي القاعديه
(د) حمض قوي ثلاثي القاعديه

٢٢٣- ايا من المواد الحامضيه الاتيه تعتبر عديدة البروتونات

- (أ) CH_3COOH (ب) NH_4^+ (ج) H_3PO_4 (د) HCOOH

٢٢٤- - الشكل البياني المقابل يوضح قاعده ثلاثه احماض فقد يكون الاحماض س ص ع ، ع



- (أ) الكبريتيك - الهيدروكلوريك - الكربونيك
(ب) الستريك - النيتريك - الكربونيك
ج الكربونيك - الاسيتيك - الهيدروكلوريك
(د) الستريك - الكبريتيك - الهيدروكلوريك


٢٢٥- - ايا مما ياتي يعتبر قاعده احاديه الهيدروكسيل

- (أ) NH_4OH (ب) HOH (ج) CH_3COOH (د) $\text{Mg}(\text{OH})_2$

٢٢٦- - ايا من الاختيارات الاتيه يتضمن احماض وقواعد ضعيفه فقط

- (أ) $\text{Ba}(\text{OH})_2$, CH_3NH_2 , CH_3COOH
(ب) $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$, HCOOH
(ج) NH_3 , NHO_3 , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
(د) NH_3 , NaOH , H_2CO_3

٢٢٧- يعبر عن ذوبان الماده XH_3 في الماء بالمعادله :



ما نوع الماده XH_3


- (أ) حمض قوي (ب) قاعده قويه (ج) حمض ضعيف (د) قاعده ضعيفه
٢٢٨- ايا من المواد الاتيه يكون محلولها المائي هو الاعلى في تركيز ايونات الهيدروكسيد

- (أ) PO_4^{3-} (ب) NH_4^+ (ج) HCO_3^- (د) H_2CO_3

٢٢٩- ايا من هذه الخصائص يستدل منها على ان الماده X من القلويات

- (أ) تعطي عند ذوبانها في الماء ايونات الهيدروجين الموجبه
(ب) تتعادل مع الاحماض مكونه ملح وماء مع تصاعد غاز CO_2
(ج) عند تسخين محلولها مع كلوريد الامونيوم يتصاعد غاز NH_3
(د) تتفاعل مع الاحماض و يتصاعد غاز H_2

الكشف عن الاملاح



شق حامضي قوى شق قاعدي قوى متبادل
شق حامضي قوى شق قاعدي ضعيف حامضي
شق حامضي ضعيف شق قاعدي قوى قاعدي
شق حامضي ضعيف شق قاعدي ضعيف متبادل

ملحوظة

pH أو الاس الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني
لو اقل من ٧ يكون المحلول حمضي ولو كان اكبر من ٧ يكون قاعدي ولو يساوى ٧ يكون متبادل

٢٣٠- في محلول فورمات الصوديوم يكون لون دليل ازرق بروموثيمول

(أ) الأحمر الوردي (ب) الأزرق (ج) الأصفر (د) الأخضر

٢٣١- في محلول فوسفات الكالسيوم يكون لون دليل الميثيل البرتقالي

(أ) الأحمر الوردي (ب) الأصفر (ج) الأزرق (د) الأخضر

٢٣٢- باستخدام الشقوق الحامضية و القاعدية التالية في تكوين املاح ،



٢٣٣- الملح الذي يكون الاس الهيدروجيني له اقل من ٧

(أ) كلوريد الامونيوم (ب) كبريتات الكالسيوم (ج) كربونات الامونيوم (د) كلوريد الباريوم

٢٣٤- الرقم الهيدروجيني PH لمحلول حمضي قوي

(أ) ٧ (ب) ٦ (ج) ١ (د) ١٤

٢٣٥- في الوسط المتبادل يكون الدليل له لون بنفسجي هو

(أ) عباد الشمس (ب) الفينولفثالين (ج) الميثيل البرتقالي (د) أزرق بروموثيمول

- ٢٣٦- في الوسط المتعادل يكون الدليل الذي له لون بنفسجي هو
 (أ) عباد الشمس (ب) الفينولفثالين (ج) الميثيل البرتقالي (د) أزرق بروموثيمول

لاحظ

- ترتيب المحاليل تبعا للاس الهيدروجيني تصاعديا
- وتبعا لتركيز الهيدروجين تنازليا
- الاحماض القوية - الاحماض الضعيفة - الاملاح الحامضية - الاملاح المتعادلة - الاملاح القاعدية - القواعد الضعيفة - القواعد القوية
- المحلول المحتوي على قلة من ايونات H^+ تكون قيمة الاس الهيدروجيني له كبيرة

٢٣٧- رتب المركبات الاتية حسب قيمه الاس الهيدروجيني

- اسيتات صوديوم - هيدروكسيد صوديوم - كبريتات بوتاسيوم - حمض كبريتيك
 نترات امونيوم - هيدروكسيد امونيوم - حمض لاكتيك

ملحوظة

اضافة ماء (تخفيف) لحمض يزيد PH

اضافة ماء (تخفيف) لقاعدة يقلل PH

مثال

٢٣٨- عند اضافته ماء مقطر الى انبوبة اختبار بها حمض كبريتيك قيمه PH له ٤

يحتمل ان تصبح قيمه PH للمحلول المخفف

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٨

العلاقة بين تركيز ايون الهيدروجين



٢٣٩- كلما زادت قيمه الاس الهيدروجيني فان تركيز ايون الهيدروجين

- (أ) يقل (ب) يزيد (ج) يزيد قم يقل (د) يقل ثم يزيد

٢٤٠- يعتبر الماء النقي متعادلاً لأنه :

- (أ) درجة تأينه قليلة
 (ب) يحتوي على ايونات H_3O^+ فقط
 (ج) $[OH^-] = [H_3O^+]$
 (د) يحتوي على ايونات OH^- فقط

٢٤١- قيمة الرقم الهيدروجيني لـ أكبر من 7

- (أ) عصير الليمون (ب) عصير الطماطم (ج) صودا الخبز (د) الخل

٢٤٢- عند الوصول الى نقطة التعادل في احدى عمليات المعايرة يتغير اللون من

- (أ) البرتقال الى الاحمر
 (ب) الاصفر الى الاخضر
 (ج) عديم اللون احمر الوردي
 (د) الازرق الى الاحمر

٢٤٣- ايا من الادله الاتيه يتلون باللون الاصفر عند اضافته لمحلول قيمه PH له ١٠
(أ) الميثيل البرتقالي (ب) ازرق بروموثيمول (ج) الفينولفثالين (د) عباد الشمس

٢٤٥- ايا من السوائل الاتيه تحتوي على التركيز الاعلى من ايونات الهيدرونيوم

(أ) محلول H_2CO_3 تركيزه 1M (ب) الماء النقي
(ج) محلول HCl تركيزه 1M (د) محلول NH_3 تركيزه 1M

٢٤٦- ايا من المحاليل الاتيه - متساويه التركيز - تكون قيمه PH له اقل ما يمكن

(أ) محلول النشادر (ب) محلول حمض الاسيتيك
(ج) محلول هيدروكسيد الليثيوم (د) محلول حمض النيتريك

٢٤٧- قيمه PH لمحلول NaOH تركيزه 0.1M تساوي

(أ) ٠.١ (ب) ١ (ج) ٨ (د) ١٣

٢٤٨- يعرف الملح $(NH_4)_2HPO_4$ باسم

(أ) فوسفات النشادر (ب) فوسفات الامونيوم الهيدروجينية
(ج) فوسفات الامونيوم (د) فوسفيد الامونيوم الهيدروجينية

٢٤٩- اذا كانت صيغة احد املاح الكروم هي $Cr(NO_3)_3$

فما صيغة اكسيد الكروم المقابلة

(أ) CrO (ب) CrO_2 (ج) Cr_2O_3 (د) Cr_3O_2

٢٥٠- ايا من محاليل الاملاح التاليه يكون فيه تركيز ايونات الهيدروكسيد اكبر من تركيز ايونات

الهيدروجين

(أ) $Ba(NO_3)_2$ (ب) $NaClO_4$ (ج) CH_3COOK (د) $CuSO_4$

تمت بحمد الله

اللهم لاسهل الا جعلته سهلا وانت ان شئت جعلت الصعب سهلا

فيسر لنا كل امر عسير يا رب العالمين